



COMMENTO

Negli areali costieri la pressione del parassita è in aumento, la percentuale di attacco risulta essere ancora inferiore alla soglia di intervento. Gli elevati livelli termici sembrano limitare lo sviluppo del patogeno. Nelle aziende biologiche si consiglia di impostare i programmi di difesa preventiva. Resta valida l'adozione di pratiche di imbiancatura con SURROUND e DACUSOL/MANISOL sia per ridurre l'eventuale cascola dovuta allo stress termico, che per limitare le ovideposizioni.

CONSIGLIO GENERICO SUL TRATTAMENTO

Convenzionale

KOHINOR OLEA 0,75 lt/Ha (Max 1 trattamento/anno)
SURROUND 4 Kg/hl (25Kg/Ha) + POLTIGLIA DISPERS 0,5 Kg/hl (5Kg/Ha)
DACUSOL/MANISOL 4 Kg/hl (25Kg/Ha)

Biologico

SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha (con le modalità di distribuzione previste)
SURROUND 4 Kg/hl (25Kg/Ha) + POLTIGLIA DISPERS 0,5 Kg/hl (5Kg/Ha)
DACUSOL/MANISOL 4 Kg/hl (25Kg/Ha)

LEGENDA

- PUNTI DI MONITORAGGIO
- NON TRATTARE (Relativamente all'impiego di prodotti larvicidi)
- ATTENZIONE MONITORARE
- (S.T.) SOTTO TRATTAMENTO

<i>Bactrocera (Dacus) oleae</i> (Mosca dell'Olio)						
PUNTO	LOCALITA'	% ATTACCO (*)	INFO SU ATTACCO E ULTIMO TRATTAMENTO	INTERVENTO	TRATTAMENTO CONSIGLIATO CONVENZIONALE	TRATTAMENTO CONSIGLIATO BIOLOGICO
GR01	MONTEMASSI	1	Presenza di uova		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR02	BRACCAGNI	0%	Olive non recettive assenza di punture		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR03	MARRUCHETI	0%	Olive non recettive assenza di punture		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR04	ROSELLE	N.D.			SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR05	ARCILLE	N.D.			SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR06	OTTAVA ZONA GRANCIA	0%	Assenza di punture		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR08	ALBERESE	4%	Presenza di larve ed uova		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR09	STERPETI DI MAGLIANO	2%	Presenza di larve		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR10	MONTIANO	0%	Nell'oliveto monitorato le olive risultano ancora non ricettive		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR11	PUNTONI DI MAGLIANO	5%	Presenza di larve ed uova		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR12	LA BARCA DI ALBINIA	9%	Presenza di larve ed uova		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR13	MARSILIANA	4%	Presenza di larve ed uova		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR14	PITIGLIANO	2%	Presenza di larve		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl
GR15	S.MARTINO SUL FIORA	6%	Presenza di larve ed uova		SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl	SURROUND 4,0 Kg/hl + POLTIGLIA 0,5 Kg/hl DACUSOL 4,0 Kg/hl

(*) Rappresenta la percentuale di olive con presenza di uova o di larve attive.

Il presente bollettino ha solo scopo informativo. Relativamente alle dosi di impiego dei prodotti consigliati nonché alle modalità di applicazione, tempi di carenza e dosaggi, attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate in etichetta. Contattare il servizio tecnico per qualsiasi necessità o chiarimento.